

## 技术说明书

### 1. 细胞系信息

|        |  |
|--------|--|
| 细胞系编号  | MO0230   |
| 代次     | P2   |
| 细胞系名称  | Ba/F3 EGFR- L792H C797S L858R                      |
| 基因 ID  | NM_005228.3  |
| 宿主细胞系  | 小鼠 BaF3 细胞系  |
| 细胞类型   | 原 B 细胞   |
| 描述     | Ba/F3 克隆，稳定表达携带 L792H C797S L858R 突变的外源性人 EGFR 基因。 |
| 数量     | 5×10 <sup>6</sup> /冻存管                             |
| 稳定性    | 稳定培养至少 10 代  |
| 应用     | 药物筛选，动物药效学活性测试                                     |
| 冻存液    | 80% RPMI-1640+ 10%FBS + 10% DMSO                   |
| 培养基    | RPMI 1640+10% FBS+1% Pen/Strep                     |
| 形态     | 多为单个、圆形悬浮细胞  |
| 传代培养   | 每 3 天以 1: 10 传代培养                                  |
| 培养条件   | 37°C, 5% CO <sub>2</sub>                           |
| 存储     | 用 80%培养基, 10%FBS 和 10%DMSO 在液氮中冷冻                  |
| 倍增时间   | 约 20 小时  |
| 支原体状态  | 阴性   |
| 生物安全等级 | 1  |
| 储存     | 接收后立即放入液氮  |

### 2. 背景

EGFR,表皮生长因子受体,是一种细胞表面受体酪氨酸激酶,并通过结合其特异性配体激活,如表皮生长因子(EGF)和转化生长因子 $\alpha$ (TGF- $\alpha$ ),过表达或过度活跃与许多癌症有关,包括肺癌和结肠癌。

EGFR 作为驱动基因的鉴定导致了抗癌治疗剂的发展。包括吉非替尼.埃洛替尼.阿法替尼.奥希替尼(AZD9291)和西妥昔单抗。


Ba/F3 细胞是小鼠 IL-3 依赖的原 B 细胞系,是研究激酶及其抑制剂的一个流行系统,这是因为一些蛋白激酶可以使 Ba/F3 细胞依赖于激酶的活化而不是 IL-3 的补充,而它们的抑制剂可以拮抗激酶依赖性生长。

### 3. 细胞系构建方法


Ba/F3 EGFR- L792H C797S L858R 细胞系是使用表达人 EGFR 突变序列的逆转录病毒载体生成的。

### 4. PCR 产物测序鉴定

L792H C797S




L858R



## 5. 应用

- 基于细胞的激酶抑制筛选
- 细胞活力测定
- 体内药效研究

| compound    | Abs.IC50(nM) | Rel.IC50(nM) |
|-------------|--------------|--------------|
| Osimertinib | 28.68        | 725.00       |
| Afatinib    | 27.70        | 601.80       |



## 6. 细胞复苏

- 在 37°C 水浴锅中预热培养基 (RPMI-1640+10%FBS+1% P/S);

2. 将冷冻管在 37°C 水浴锅中融化;
3. 将冷冻管转移到生物安全柜中, 并用 75%乙醇擦拭表面;
4. 将细胞悬液转移到含有的 9.0 mL 完全培养基的 15 ml 离心管中;
5. 室温下 1000 rpm 离心 5 min, 弃去上清液;
6. 用适当体积的完全培养基重悬细胞沉淀, 并将细胞悬液转移到 T25 培养瓶;
7. 将培养瓶置于 37°C 孵育, 5 % CO<sub>2</sub> 培养箱中培养;
8. 每 3 天以 1: 10 传代培养;

## 7. 细胞冻存

1. 细胞冻存前准备好新鲜的冷冻培养基 (80% RPMI-1640+ 10%FBS + 10% DMSO);
2. 将冷冻培养基放入冰箱预冷;
3. 将培养瓶中细胞转移到离心管中, 并计数细胞量;
4. 将细胞在室温下离心 1000 rpm 5 min, 弃去上清液.;
5. 使用冷冻培养基重悬至  $1 \times 10^6$ /ml 细胞;
6. 将细胞悬液转移到冻存管中, 放入程序降温盒;
7. 在 -80°C 冰箱中过夜, 转移到液氮中长期储存。